



NHDELTA Ca

NHDelta Ca to wysoce efektywny nawóz doglebowy i dolistny szerokiego zastosowania. Kombinacja stabilizowanego azotu z wapniem odżywia rośliny powodując silny rozrost masy korzeniowej, poprawę jakości plonu oraz lepszy wzrost.

PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

NHDELTA Ca

PROSTY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

N (Ca) Nawóz w roztworze 15 (+9) zawierający mikroskładnik pokarmowy Bor (B)

ZADEKLAROWANA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH (m/m):

15% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)

5,0% azotu azotanowego

10,0% azotu mocznikowego

9% TLENKU WAPNIA (CaO) (=6,4% Ca) rozpuszczalnego w wodzie

Mikroskładnik pokarmowy jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie: 0,1% boru (B) w formie kwasu borowego.

WYKAZ SKŁADNIKÓW:

Woda¹ (nr CAS 7732-18-5); Kwas azotowy, sól amonowo-wapniowa¹ (nr CAS 15245-12-2); Mocznik¹ (nr CAS 57-13-6);

¹CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

Nawóz NHDelta Ca może być stosowany w uprawie zbóż, rzepaku, ziemniaków, kukurydzy, buraków cukrowych, wszystkich warzyw w polu i pod osłonami, sadów i roślin jagodowych. Szczegółowe zalecenia w tabeli. NHDelta Ca można mieszać z większością znanych nawozów dolistnych i agrochemikaliów. Unikać mieszania z produktami zawierającymi siarkę lub o wysokiej zawartości fosforanów. Zawsze należy wykonać test mieszalności. Unikać zabiegów podczas silnego nasłonecznienia. PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNAĆ. Aby uzyskać szczegółowe zalecenia i uniknąć nadmiernego nawożenia należy skontaktować się z producentem /distributorem. Podane zalecenia i informacje są wynikiem obszernych badań. Wiele czynników, na które producent/ dystrybutor nie ma wpływu (jak np. przygotowanie cieczy użytkowej, aplikacja, warunki pogodowe itp.) może mieć wpływ na właściwe użycie produktu. Użytkownik odpowiada za skutki związane z nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych na tej etykiecie w całości bądź w części.

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Produkt przechowywać w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, w temperaturze od 2°C do 40°C. Chronić przed dziećmi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. Producent tego nawozu wprowadził już środki zaradcze polegające na stabilizacji mocznika w formie amidu (NH2).

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę dróg oddechowych/obuwie ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UFI:3V00-Y06Q-N00Y-E8F2

Produkt zawiera: kwas azotowy, sól amonowo-wapniowa (CAS 15245-12-2), kwas borowy (CAS: 10043-35-3)

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Objętość netto

5L

Data produkcji/ Nr partii: na opakowaniu



Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

UPRAWA	TERMIN ZABIEGU	DAWKA
ZBOŻA OZIME	stosować w sezonie 20-30l/ha w minimum 4 zabiegach	
	BBCH 12	2,5l/ha
	BBCH 21-22-natychmiast po ruszeniu wegetacji	2,5l/ha
	BBCH 30-31	5l/ha
JĘCZMIEN OZIMY	BBCH 37-39	5l/ha. Wyższą dawkę stosować w warunkach uciążliwej suszy
	BBCH 59-65	5l/ha
	BBCH 12	2,5-5l/ha
	BBCH 21-22	2,5-5l/ha
RZEPAK OZIMY/ JARY	BBCH 30-31	2,5-5l/ha
	BBCH 37-39	5l/ha
	2-4 liście	2,5l/ha
	ozimy z jesiennym/jary z pierwszym fungicydem	2,5l/ha
NIE MIESZAĆ Z PŁYNNĄ SIARKĄ	ozimy po ruszeniu wegetacji	5l/ha
	na początku kwitnienia	* 5l/ha
KUKURYDZA	koniec kwitnienia	5l/ha
	2-8 liści prawdziwych	5l/ha
ZIEMIANKI	2-4 tygodnie później	5l/ha
	Od fazy rozety co 7 dni	2,5-4l/ha
BURAK CUKROWY	Faza 4-6 liści BBCH 14-16	5l/ha
	Po 14 dniach fazy rozety BBCH 20-28	5l/ha
	Zakrywanie międzyrzędzi BBCH 31-38	5l/ha
WARZYWA POD OSŁONAMI	Po przyjęciu się rozsady nawadnianie kropłowe w stężeniu 0,05-0,1%. Nie przekraczać jednorazowo dawki 30l/ha, w całym sezonie nie przekraczać 300l/ha	
WARZYWA POŁOWE		
KAPUSTNE	Po zakryciu międzyrzędzi 3-4 krotnie nie częściej niż co 10-14 dni	dawka 5l/ha
POMIDOR PAPRYKA	Od fazy zawiązania pierwszych owoców, zabieg powtarzać co 8-10 dni	dawka 5l/ha
CEBULA I POR	Od początku przyrastania na grubość, nie częściej niż co 10-14 dni	dawka 8l/ha
KORZENIOWE	Od momentu przyrastania korzeni na grubość, nie częściej niż co 10-14 dni	dawka 8l/ha
OGÓREK	Od fazy zawiązania owoców nie częściej niż co 10-14 dni	dawka 5l/ha
SADY		
JABŁOŃ	Odm. drobnoowocowe I - przed kwitnieniem na rozetę liściową, II - po kwitnieniu III - po opadzie czerwcowym. Kolejne po 10-14 dniach. Ostatni zabieg nie później niż 30 dni od terminu zbioru.	5l/ha. W całym sezonie nie przekraczać 30l/ha
	Odm. wielkoowocowe I - po opadzie czerwcowym. Powtarzać co 10-14 dni. Ostatni zabieg nie później niż 30 dni od terminu zbioru.	5l/ha. W całym sezonie nie przekraczać 20l/ha
GRUSZA	I - po opadzie czerwcowym. Powtarzać co 10-14 dni. Ostatni zabieg nie później niż 30 dni od terminu zbioru.	5l/ha. W całym sezonie nie przekraczać 20l/ha
CZERESNIA WIŚNIA ŚLIWA	I - po kwitnieniu; II - po zawiązaniu owoców. Kolejne po 10-14 dniach.	5l/ha. W całym sezonie nie przekraczać 20l/ha
BORÓWKA AMERYKAŃSKA	I - wiosną po ruszeniu wegetacji; II - początek kwitnienia; III - pierwsze zielone owoce; IV - pełnia zbiorów;	5l/ha
TRUSKAWKA	I - wiosną po ruszeniu wegetacji; II - początek kwitnienia; III - pierwsze zielone owoce; IV - pełnia zbiorów; V - po ścięciu liści;	5l/ha
MALINA	I - wiosną po ruszeniu wegetacji; II - początek kwitnienia, powtarzać co 2 tyg.	5l/ha

*sugerowany dodatek CALFLUX 1l/ha

Producent:
Firma: EOCULTURE BIOSCIENCES S.L.
Adres Rambla Obispo Orberá, 11 - 1ª 4
04001 Almería, Hiszpania
Tel.: +34 950 264 981 mail: info@ecoculturebs.com
strona: www.ecoculturebs.com

Dystrybutor:
Firma: Bioagris Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Adres: Lubawska 4a,
03-011 Warszawa
Tel.: +48793 797 757 mail: info@bioagris.pl
strona: www.bioagris.pl

