



NH DELTAK



8 437028 169068

CE NH DELTA K

WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NK nawóz makroskładnikowy w roztworze, 15-5 / 15-4,15

ZADEKLAROWANA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH (m/m)	
15%	CAŁKOWITEGO AZOTU (N) 13,5% azotu mocznikowego 1,5% azotu azotanowego
5%	TLENKU POTASU (K ₂ O) (= 4,15% K) rozpuszczalnego w wodzie
SKŁADNIKI	

woda¹ (Nr CAS: 7732-18-5), azotan potasu¹ (Nr CAS: 7757-79-1), mocznik¹ (Nr CAS: 57-13-6);
¹CMC1: Pierwotne surowce i mieszaniny

INSTRUKCJE I DAWKI

Nawóz NHDeltaK przeznaczony jest do szybkiego zaopatrzenia roślin w azot przy objawach niedoboru oraz do stosowania w uprawach z dodatkowym zapotrzebowaniem na potas. Może być bezpiecznie stosowany w trakcie zawiązywania i dojrzewania owoców.
Nawóz można stosować jako oprysk dolistny lub poprzez nawadnianie/ fertygację. NHDeltaK można mieszać z nawozami dolistnymi i agrochemikaliami po wykonaniu testu mieszalności.
UNIKAĆ ZABIEGÓW PODCZAS SILNEGO NASŁONECZENIA
Wstrząsnąć mocno przed zastosowaniem.
Aplikacja dolistna: zalecaną dawkę 5-7,5l/ha rozpuścić w co najmniej 200l wody/ha. W uprawach rolniczych i roślinach okopowych można stosować 3-5 aplikacji.
W uprawach ziemniaków zalecane dawki stosować co 7-10 dni.
Nie przekraczać sezonowo dawki 30 l/ha
Podczas stosowania wczesnowiosennego zredukować nawożenie dolistne innymi formami azotu o 30%.
Nie stosować łącznie z mocznikiem oraz saletrami.
Szczegółowe zalecenia znajdują się w tabeli.

UPRAWA	ZABIEG	TERMIN ZABIEGU	DAWKA
BORÓWKAWYSOKA	1	BBCH 15-19 (Rozwój liści)	5l/ha
	2	BBCH 31-39 (Początek wzrostu pędów do 90% długości pędów)	
	3	BBCH 56-59 (Początek wydłużania grona-pąki kwiatowe rozdzielone)	
	4*	BBCH 91 (Zakończenie wzrostu pędów, tworzenie pąków kwiatowych -potowa zbioru) * Stosować w dawce 5l/ha naprzemiennie z NHDelta Ca, nie częściej niż co 5 dni.	
TRUSKAWKA	1 i 2	BBCH 13 do 19 (Rozwinięty 3 liść do 10 nowych liści)	5l/ha
	3	BBCH 55 (Na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe)	
	4	BBCH 60 (Otwarte pierwsze kwiaty)	
	5*	BBCH 90 (Początek tworzenia pąków w pachwinach liści) *Podczas zbiorów stosować w dawce 5l/ha naprzemiennie z NHDelta Ca, nie częściej niż co 5 dni.	
MALINA	1	BBCH 71-79 (Rozwój owoców), powtarzać co 7 dni	5-7,5l/ha
	2	BBCH 81-89 (Dojrzewanie owoców), powtarzać co 7 dni	
JABŁOŃGRUSZA	1 i 2	BBCH 54-59 (Rozwój kwiatostanu)	5l/ha
	3	BBCH 69-71 (Kwitnienie)	
	4*	BBCH 72-79 (Rozwój owoców) 2-4 aplikacji zależnie od ilości zawiązków i odmiany, nie częściej niż co 7 dni. *Stosować naprzemiennie z NHDelta Ca, nie przekraczać łącznie dawki 30l/ha	
	5	Po zbiorach	

UPRAWA	ZABIEG	TERMIN ZABIEGU	DAWKA
CZEREŚNIA WIŚNIA ŚLIWA	1	BBCH 19 (Pierwsze liście całkowicie wykształcone)	5l/ha
	2	BBCH 55 (Faza zielonego pąka)	
	3	BBCH 69 (Koniec kwitnienia, wszystkie płatki opadły)	
	4	BBCH 72 (Rozrastanie zalążni - przeciw opadaniu zalążków) *Podczas zbiorów stosować w dawce 5l/ha naprzemiennie z NHDelta Ca, nie częściej niż co 5 dni.	
POMIDOR PAPRYKA	1	BBCH 51-53 (Początek kwitnienia)	5l/ha
	2	BBCH 64-69 (Pełnia kwitnienia)	
	3*	BBCH 71-79 (Wzrost owoców) *Stosować w dawce 5l/ha naprzemiennie z NHDelta Ca, nie częściej niż co 5 dni.	
	4	BBCH 81-89 (Początek wybarwiania owoców)	
ZIEMIENIAKI	1	BBCH 29-32 (Przed zwarciem międzyrzędzi)	5l/ha
	2	BBCH 60-69 (Kwitnienie)	
	3	BBCH 70-79 (Po kwitnieniu, rozwój owoców)	

Fertygacja: 3-10 l/ha.
W warzywach stosować po wysadzeniu co 10-15 dni. Pierwsza aplikacja po przyjęciu się rozsady.
Pozostałe uprawy stosować 2 do 4 razy w ciągu cyklu uprawy.
Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Rolnicy powinni prowadzić wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Temperatura przechowywania od 2°C do 40°C. Przechowywać w oryginalnych, szczególnie zamkniętych opakowaniach. Ilość warstw w transporcie i przechowywaniu: 4

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. Producent tego nawozu wprowadził już środki zaradcze polegające na stabilizacji mocznika w formie amidu.

INFORMACJE OGÓLNE
Nie upośledza wchłaniania wapnia i magnezu. Nie zaburza kwitnienia oraz zawiązywania owoców i nasion. Wspomaga wzrost w warunkach zasolenia i suszy. TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. Podane zalecenia i informacje są wynikiem obszernych badań. Wiele czynników, na które producent/ dystrybutor nie ma wpływu (takie jak np. przygotowanie cieczy użytkowej, aplikacja, warunki pogodowe itp.) może mieć wpływ na właściwe użycie produktu przez użytkownika. Użytkownik odpowiada za skutki związane z nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych na tej etykiecie w całości bądź w części.

Producent: ECOCULTURE BIOSCIENCES S.L.
Rambla Obispo Orberá, 11 - 1º 4, 04001 Almería, Hiszpania
Tel.: +34 950 264 981; info@ecoculturebs.com; www.ecoculturebs.com
Dystrybutor/Przepakowane przez: Bioagris sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Lubawska 4a, 03-011 Warszawa
Tel.: +48 793 797 757; info@bioagris.pl; www.bioagris.pl

Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

Objętość netto: **5l**